


玉川病院小児科で接種している主なワクチン

予防接種	予約の有無	費用区分	備考
三種混合	無	公費	1期: 3回(3~8週間隔)、1期追加: 1期3回目の接種から1年から1年6ヶ月
二種混合	有		11歳以上 13歳未満
MR(麻疹・風疹)	無		1期: 1歳以上2歳未満、2期: 幼稚園の年長に相当する学年
日本脳炎	有		原則接種見合わせ
麻疹(単独)	有	自費	MRの代わりとして定期接種として行う場合は公費
風疹(単独)	有	(公費)	MRの代わりとして定期接種として行う場合は公費
B型肝炎	有	自費 (健保)	原則3回接種(母子感染予防以外の接種は自費) 母子感染予防は健康保険適応(生後2・3・5ヶ月で接種)
おたふくかぜ	有	自費 (有料)	1歳以上
水痘	有		1歳以上
インフルエンザ	有		毎年11月頃に接種を推奨(10月下旬~12月、例年1月以降はワクチン入手が困難) 13歳未満は2回接種(1~4週間間隔: できれば4週間あけることが望ましい)
Hib(ヒブワクチン)	有		2ヶ月以上7ヶ月未満: 初回免疫3回(4~8週間隔)、追加免疫1回接種(初回免疫後1年) 7ヶ月以上1歳未満: 初回免疫2回(4~8週間隔)、追加免疫1回接種(初回免疫後1年) 1歳以上5歳未満: 1回接種
<p>BCG: 世田谷区では4ヶ月健診時に区の施設等で接種します。原則として6ヶ月未満の接種に公費が支給されます。</p> <p>ポリオ: 世田谷区では春と秋に区の施設等で接種します(集団接種)。当院で接種することはできません。現時点で日本は内服するワクチンを2回服用します(6週間以上間隔をあける)。</p>			

乳児におけるワクチン接種のスケジュール例



- **三種混合ワクチン**は生後3ヶ月から接種できます（生後90ヶ月までは公費）
- 三種混合ワクチンは1期として3～8週間間隔で3回接種します。
- 三種混合ワクチンを接種した後、1週間以上あければ他のワクチンを接種できます。
- **BCG**は世田谷区では生後4ヶ月に行われる区の健診時に接種します（生後6ヶ月未満は公費）。
- BCG接種を行った後、他のワクチンを接種するためには4週間以上あなければなりません。
- この他、乳児期に受けなければならない予防接種として**ポリオワクチン**があります。
- ポリオワクチンは世田谷区では春と秋に区の施設等で接種します（集団接種）。当院で接種することはできません。
- ポリオワクチン接種を行った後、他のワクチンを接種するためには4週間以上あなければなりません。