

糖尿病科

| 2型糖尿病                             | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 単位 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 1ヶ月平均外来患者数(新患を含む)                 | 575.3  | 564.3  | 513.3  | 人  |
| 食事・運動療法のみ                         | 10.4   | 10.4   | 8.2    | %  |
| 経口糖尿病薬単独療法患者割合                    | 61.8   | 62.4   | 60.6   | %  |
| インスリン療法患者割合(含む経口糖尿病薬併用)           | 12.4   | 9.2    | 13.8   | %  |
| GLP-1製剤使用患者割合(含む経口糖尿病薬併用)         | 7.4    | 8.9    | 9.3    | %  |
| インスリン+GLP-1製剤(含む経口糖尿病薬併用)         | 7.6    | 8.0    | 8.0    | %  |
|                                   |        |        |        |    |
| 2型糖尿病患者全体に占めるHbA1c8.0%(NGSP)以上の割合 | 10.9   | 6.8    | 10.1   | %  |
| 2型糖尿病患者全体に占めるLDL-C120mg/dl以上の割合   | 24.7   | 21.9   | 15.4   | %  |
| 2型糖尿病患者全体に占めるBMI25以上の割合           | 45.0   | 46.4   | 40.7   | %  |
| 2型糖尿病患者全体に占める血圧140/90mmHg以上の割合    | 19.4   | 20.7   | 12.2   | %  |
| 2型糖尿病患者全体に占めるeGFR30未満の割合          | 0.9    | 2.7    | 3.5    | %  |
| 2型糖尿病患者全体に占めるeGFR30-60未満の割合       | 28.2   | 29.3   | 30.3   | %  |